

本署檔號 Our Ref. : (185) in DH/SEB/CD/8/19/1

各位校長／機構負責人：

提高警覺 預防急性腸胃炎

本港正進入急性腸胃炎的傳統高峰期，衛生署衛生防護中心現特來函告知有關急性腸胃炎的最新情況，並懇請閣下提高警覺，預防急性腸胃炎。

衛生防護中心留意到最近急性腸胃炎的活躍程度有所上升。院舍急性腸胃炎爆發數字由第四十周(二零一七年十月一日至七日) 錄得的兩宗報告上升至上周錄得的八宗報告。第四十五周的首三日(十一月五日至七日) 已錄得三宗院舍爆發報告。此外，定點幼兒中心/幼稚園數據亦顯示急性腸胃炎的活躍程度有相應的上升。中心正密切留意最新情況。

諾如病毒及輪狀病毒是最常引致急性腸胃炎的病原體。感染的徵狀包括惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒及疲倦。病毒可透過進食受污染的食物、直接接觸患者的嘔吐物或排泄物、接觸受污染的物品或經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。病毒具高傳染性，有可能導致難以控制的疾病爆發。急性腸胃炎爆發全年都有機會發生，但較常見於冬季月份。

要預防急性腸胃炎在院舍內爆發，應加緊注重個人、食物及環境衛生，特別要小心處理嘔吐物及排泄物。中心建議採取以下措施：

1. 提醒兒童/學生及員工保持個人衛生，尤其是進食前及如廁後應用梘液徹底清潔雙手。
2. 提醒兒童/學生、員工及其家人保持食物衛生。確保所有食物尤其是貝殼類海產應徹底煮熟。



3. 教導員工正確處理嘔吐物的方法及程序：
 - 在清理過程中，勿讓學生/兒童走近。
 - 在清理嘔吐物時戴上手套及口罩。
 - 用即棄抹布由外至內抹去嘔吐物，再用 1 比 49 稀釋漂白水清洗染污的地方表面及附近地方(例如嘔吐物兩公尺範圍內)。
 - 讓漂白水在污染的地方表面停留十五至三十分鐘，然後再以清水清洗，並讓表面自然乾透。
 - 切勿以拖把清理嘔吐物。
 - 所有清理工作完畢後，必須徹底洗手。
4. 保持噴射式飲水器的噴水口及防護裝置免被口腔及呼吸道分泌物污染，並提醒員工/學生/兒童在使用噴射式飲水器時應注意以下事項：
 - 兒童使用噴射式飲水器飲用食水時，身體不應與噴水口防護裝置有直接接觸；
 - 年幼的兒童不應直接自噴射式飲水器飲用食水，應使用個別的水杯；
 - 如學校備有用完即棄的紙杯供學生使用，應把未用的紙杯妥善貯存於適當的容器，並同時預備有蓋的廢紙箱供學生棄置使用後的紙杯；
 - 嚴禁吐痰在飲水器內。
5. 患病員工，尤其是處理食物的員工應該放病假，以防止疾病蔓延。
6. 避免讓受感染的學童及員工返回學校 / 中心，直至腹瀉或嘔吐停止最少兩天後，或按醫生建議為準。

學校、日托中心及住宿院舍是較高風險出現傳染病爆發。所以現懇請 各校長／機構負責人提高警覺預防傳染病。「學校/幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心預防傳染病指引」載有傳染病的預防和控制措施的實用資料，該指引可在以下網站瀏覽：

<http://www.chp.gov.hk/tc/content/9/460/24522.html>

如發現有腸胃炎徵狀或其他傳染病的員工/學生/兒童人數有所增加，請盡早通知衛生防護中心的傳染病中央呈報辦公室（傳真號碼：2477 2770，電話號碼：2477 2772），使調查及控制措施能及早進行。

感謝閣下對預防和控制傳染病的支持。

衛生署衛生防護中心總監

(張竹君  醫生代行)

二零一七年十一月八日